



Preparación para su endoscopia con cápsula (Esta es una cita de dos días)

El procedimiento: este procedimiento consiste en ingerir una pequeña cápsula (del tamaño de una vitamina grande) que pasará de forma natural por su sistema digestivo mientras se toman imágenes de su intestino. Después de doce horas, se quitará el cinturón registrador y se lo devolverá a su médico para que lo procese. Para que su médico obtenga la información más precisa de este examen, deberá seguir las siguientes instrucciones:

Artículos que debe comprar en su farmacia:

- Un frasco de citrato de magnesio
- Phazyme 250mg

Cinco días antes: no ingiera hierro

El día anterior a la cita:

- Absténgase de fumar 24 horas antes de la intervención
- Dieta líquida clara a partir de las 12:00 (mediodía) del día anterior a la intervención
- Tómese un frasco de citrato de magnesio a las 18:00 horas
- Beba muchos líquidos claros después de tomarse el laxante
- No beba nada después de medianoche
- Tómese dos tabletas de Phazyme 250 dos horas antes del procedimiento

NO COMA NI BEBA NADA EL DÍA DE LA INTERVENCIÓN

Después de ingerir la cápsula Pill Cam SB:

- No coma ni beba nada durante al menos seis horas después de haber ingerido la cápsula. Después de seis horas, puede tomar un ligero refrigerio y tomarse sus medicamentos.
- La grabación dura aproximadamente doce horas. Transcurridas doce horas desde que ingirió la cápsula, puede desconectar el equipo.
- Evite cualquier actividad física extenuante. **NO SE INCLINE** mientras la cápsula está grabando.

**DEVUELVA EL EQUIPO AL DÍA SIGUIENTE ANTES DE LAS 11:00, DEBE ENTREGARLO EN
600 MAMARONECK AVE, SUITE 301, HARRISON**